膵臓がん

GEM＋nab-PTX(1クール28日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	・・・・	28
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	●							●							●					
アブラキサン	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	125mg/㎡	●							●							●					

GEM(1クール28日、催吐リスク：軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	・・・・	28
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	●							●							●					

mFOLFIRINOX(1クール14日、催吐リスク：高度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン	オキサリプラチン	85mg/㎡	●													
トポテシン	イリノテカン	150mg/㎡	●													
レボホリナート	レボホリナート	200mg/㎡	●													
5-FU（持続点滴）	フルオロウラシル	2400mg/㎡	●→46時間													

Onivyde＋5FU(1クール14日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オニバイド	イリノテカン（リポソーム製剤）	70mg/㎡	●													
レボホリナート	レボホリナート	200mg/㎡	●													
5-FU（持続点滴）	フルオロウラシル	2400mg/㎡	●→46時間													